定期接種

# ロタウイルスワクチン

飲むワクチン（生ワクチン）

乳幼児の重い胃腸炎（はげしい嘔吐・下痢・脱水）の原因になるロタウイルス感染症を防ぎます。


## 対象年齢・回数・間隔

| | |
|---|---|
| **1回目** | **生後2か月〜14週6日まで**に受けてください（遅れると受けられません） |
| **回数** | ワクチンの種類で2回または3回（27日以上あけて） |
| **期限** | 2回タイプ：生後24週0日まで／3回タイプ：生後32週0日まで<br>**期限を過ぎると受けられません。** |
| **受けられない方** | 腸重積症を起こしたことがある／腸重積を起こしやすい生まれつきの腸の病気があり、治療が終わっていない／重症複合免疫不全（SCID）がある／ワクチンの成分で強いアレルギーを起こしたことがある |
| **吐き出したとき** | 飲んだ後に吐き出しても、**もう一度飲む必要はありません**（国の定め）。 |

## 副反応と接種後の注意

- ぐずり、下痢、嘔吐などがみられることがあります。
- まれに**腸重積**（腸が腸にはまりこむ病気）が起こることがあります。何回目の接種でも、接種後**3週間**ほど、特に**1週間**は注意してください。
- 接種後**30分**ほどは、何かあったときに**すぐクリニックに戻れる場所**で様子を見てください。
- 当日の入浴はできます。
- おむつ替えのあとは手をよく洗ってください（便にワクチンのウイルスが出ることがあります）。

**腸重積のサイン：**泣いたり泣きやんだりをくり返す、くり返し吐く、血の混じった便（いちごジャムのような便）、ぐったりして顔色が悪い → **すぐに受診**してください。
ほかの医療機関を受診するときは**母子健康手帳**を持って行き、ロタウイルスワクチンを受けたことを伝えてください。




**すぐ受診・連絡してほしいとき：**高い熱が続く、けいれん、ぐったりしている、顔色が悪い、じんましん・息苦しさ、接種した部位が大きく腫れて痛がる など

## 持ち物・当日の注意

- **母子健康手帳**
- **横浜市の予診票**（市から届いたもの。事前に記入してください）
- 住所・氏名・生年月日が分かるもの（小児医療証、マイナンバーカードなど）
- 保護者が付き添えない場合は**委任状**（原則、保護者の付き添いが必要です）
- 朝、おうちで**体温を測って**きてください。37.5℃以上の場合は接種できません。
- 体調が悪いとき、最近かぜや感染症にかかったときは、ご来院前にお電話でご相談ください。

**がんばったね！**

ワクチンをがんばったお子さまを、たくさんほめてあげてください。
「よくがんばったね」のひと言が、次の接種の勇気になります。

© 2026 くつまこどもクリニック　TEL 045-901-0011　2026年11月改訂　無断転載・複製を禁じます