定期接種

BCG（結核）

スタンプ式の接種（生ワクチン）

結核、特に赤ちゃんで重くなりやすい結核性髄膜炎などを防ぎます。

対象年齢・回数・間隔

対象	1歳になる前まで（無料）
回数	1回
おすすめの時期	生後5〜8か月

副反応と接種後の注意

- 接種後**2〜4週間**ごろから、針のあとが赤くなり、小さなうみが出ることがあります。正常な反応で、**3か月**ほどで落ち着きます。
- わきの下のリンパ節が腫れることがあります。
- 接種後、針のあとが**乾くまで（10分ほど）**服をかぶせず、さわらないでください。
- 当日の入浴はできます。接種した場所はこすらないでください。
- 針のあとに絆創膏やガーゼは**貼らない**でください。うみはふき取る程度で大丈夫です。

接種後10日以内に針のあとが強く赤く腫れたり、うんだりしたら（コッホ現象）、結核に感染している可能性があります。**すぐにご連絡ください。**

すぐ受診・連絡してほしいとき：高い熱が続く、けいれん、ぐったりしている、顔色が悪い、じんましん・息苦しさ、接種した部位が大きく腫れて痛がる など

持ち物・当日の注意

- **母子健康手帳**
- **横浜市の予診票**（市から届いたもの。事前に記入してください）
- 住所・氏名・生年月日が分かるもの（小児医療証、マイナンバーカードなど）
- 保護者が付き添えない場合は**委任状**（原則、保護者の付き添いが必要です）
- 朝、おうちで**体温を測って**きてください。37.5℃以上の場合は接種できません。
- 体調が悪いとき、最近かぜや感染症にかかったときは、ご来院前にお電話でご相談ください。

がんばったね！

注射をがんばったお子さまを、たくさんほめてあげてください。
「よくがんばったね」のひと言が、次の接種の勇気になります。

© 2026 くつまこどもクリニック　TEL 045-901-0011　2026年11月改訂　無断転載・複製を禁じます