定期接種

日本脳炎ワクチン

注射（不活化ワクチン）

蚊がうつす日本脳炎を防ぎます。かかると重い後遺症が残ることがある病気です。

対象年齢・回数・間隔

1期初回	3歳のあいだに、6〜28日あけて**2回**（生後6か月から受けられます）
1期追加	2回目から約1年後（4歳ごろ）に**1回**
2期	9歳のあいだに**1回**
早めの接種	流行地域（アジアなど）への渡航・滞在など、感染のリスクが高い場合は、**生後6か月から**の接種開始を日本小児科学会がすすめています。ご相談ください。
ご注意	受けそびれがある場合は、無料で受けられることがあります。ご相談ください。

副反応と接種後の注意

- 接種した場所が赤くなる、腫れることがあります。
- 発熱することがあります。
- 接種後**30分**ほどは、何かあったときに**すぐクリニックに戻れる場所**で様子を見てください。
- 当日の**入浴はできます**。接種した場所はこすらないでください。
- 当日は激しい運動は控えてください。

すぐ受診・連絡してほしいとき：高い熱が続く、けいれん、ぐったりしている、顔色が悪い、じんましん・息苦しさ、接種した部位が大きく腫れて痛がる など

持ち物・当日の注意

- **母子健康手帳**
- **横浜市の予診票**（市から届いたもの。事前に記入してください）
- 住所・氏名・生年月日が分かるもの（小児医療証、マイナンバーカードなど）
- 保護者が付き添えない場合は**委任状**（原則、保護者の付き添いが必要です）
- 朝、おうちで**体温を測って**きてください。37.5℃以上の場合は接種できません。
- 体調が悪いとき、最近かぜや感染症にかかったときは、ご来院前にお電話でご相談ください。

がんばったね！

注射をがんばったお子さまを、たくさんほめてあげてください。
「よくがんばったね」のひと言が、次の接種の勇気になります。

© 2026 くつまこどもクリニック　TEL 045-901-0011　2026年11月改訂　無断転載・複製を禁じます