定期接種

二種混合ワクチン（DT）

注射（不活化ワクチン）

ジフテリアと破傷風を防ぎます。乳幼児期の接種でついた免疫を強めます。

対象年齢・回数・間隔

対象	11歳〜13歳になる前まで（無料）
回数	**1回**（11歳のあいだがおすすめ）

副反応と接種後の注意

- 接種した場所が赤くなる、腫れる、痛むことがあります。数日で落ち着きます。
- 接種後**30分**ほどは、何かあったときに**すぐクリニックに戻れる場所**で様子を見てください。
- 当日の**入浴はできます**。接種した場所はこすらないでください。
- 当日は激しい運動は控えてください。

すぐ受診・連絡してほしいとき：高い熱が続く、けいれん、ぐったりしている、顔色が悪い、じんましん・息苦しさ、接種した部位が大きく腫れて痛がる など

持ち物・当日の注意

- **母子健康手帳**
- **横浜市の予診票**（市から届いたもの。事前に記入してください）
- 住所・氏名・生年月日が分かるもの（小児医療証、マイナンバーカードなど）
- 保護者が付き添えない場合は**委任状**（原則、保護者の付き添いが必要です）
- 朝、おうちで**体温を測って**きてください。37.5℃以上の場合は接種できません。
- 体調が悪いとき、最近かぜや感染症にかかったときは、ご来院前にお電話でご相談ください。

がんばったね！

注射をがんばったお子さまを、たくさんほめてあげてください。
「よくがんばったね」のひと言が、次の接種の勇気になります。

© 2026 くつまこどもクリニック　TEL 045-901-0011　2026年11月改訂　無断転載・複製を禁じます